Transfert de connaissances en médecine de premier recours

27 juin 2017

Prof. Dr. med Reto Auer
Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM)

reto.auer@biham.unibe.ch

Twitter : @retoauer

Polypes and cancer du côlon

Paroi normale

Polype

Cancer

Colonoscopie

Etape 2 pour votre dépistage:

1

Notez sur l'étiquette du tube plat votre nom, prénom, date de naissance, ou collez une étiquette si vous avez reçu une lettre d'invitation.

2

Avant d'aller à la selle, disposez le système de recueil des selles sur la cuvette des WC selon les instructions.

3

Après émission des selles...

4

...ouvrez le tube plat en dévissant délicatement le bouchon turquoise: la tige de prélèvement apparaît

5

«Râclez» les selles en 5 à 6 endroits différents avec la tige turquoise. Tous les sillons doivent être remplis de selles.

6

Remettez la tige dans le tube et refermez le. Un clic sonore confirme que le tube est bien fermé.

7

Secouez énergiquement le tube de prélèvement fermé. Glissez le dans le sachet plastique, puis dans l'enveloppe d'expédition.

8

Expédiez au plus vite le tube de prélèvement **ainsi que le formulaire** au laboratoire d'analyse. Un envoi rapide garantit une meilleure fiabilité du test.

Pour plus d'informations ou des instructions plus détaillées, veuillez contacter votre pharmacien, votre médecin, ou téléphonez nous: Fondation vaudoise pour le dépistage du cancer - Epalinges - 021 314 14 36

Votre résultat vous parviendra dans un délai de huit jours

En absence de
dépistage, environs
2 personnes sur 100
décéderont de cancer
du colon avant 80 ans
en Suisse.

En présence d'un
dépistage, environs
1 personnes sur 100
décédera de cancer du
colon avant 80 ans en
Suisse.

2 options
offertes:

Recherche de
sang occulte
dans les selles

Chaque 2 ans

ou

Coloscopie de
dépistage

Chaque 10 ans

Comment réaliser le test?	<ul style="list-style-type: none"> → Prélèvement au domicile d'une quantité minimale de selles à l'aide d'un dispositif spécialement fourni → Envoi postal et analyse du prélèvement dans un laboratoire spécialisé 	<ul style="list-style-type: none"> → «Préparation au domicile»: régime alimentaire durant 48 heures et absorption d'une solution spéciale pour «nettoyer» son intestin la veille → Réalisation dans le cabinet d'un gastroentérologue ou en clinique/hôpital <ul style="list-style-type: none"> ▶ → Vous recevrez généralement un sédatif pour permettre un léger endormissement ▶ → L'examen dure habituellement 30-45 minutes, parfois davantage s'il faut enlever des polypes
Obtention des résultats	→ Retour des résultats par courrier à votre domicile et vers votre médecin	→ Résultat oral de votre examen le jour même, compte rendu définitif par courrier à votre domicile et vers votre médecin
Remboursement du test	→ Remboursement entre 50 et 69 ans par l'assurance de base avec exemption de franchise (coût résiduel par test: 4.60 CHF)	→ Remboursement entre 50 et 69 ans par l'assurance de base avec exemption de franchise (coût résiduel par test: entre 80 et 160 CHF)
Rythme de réalisation	→ Tous les deux ans	→ Tous les dix ans
Quels sont les avantages?	<ul style="list-style-type: none"> → Pas de préparation nécessaire → Facile à réaliser 	<ul style="list-style-type: none"> → Meilleur test pour détecter les polypes avant qu'ils n'évoluent en cancer → Les polypes sont directement enlevés pendant l'examen
Fiabilité pour détecter le cancer du colon	→ Bonne si réalisation régulière, tous les 2 ans	→ Excellente, si la «préparation au domicile» est correctement réalisée
Quels sont les inconvénients?	<ul style="list-style-type: none"> → Risque de résultat « faux négatif»: polypes et cancers ne saignent pas toujours. Il faut donc répéter le test tous les deux ans au minimum → Risque de résultat « faux positif»: un saignement digestif peut s'observer sans présence de polype ou cancer → En cas de test positif, il faudra réaliser systématiquement une coloscopie 	<ul style="list-style-type: none"> → Risque très faible de complication sévère (perforation de l'intestin ou saignement important): environ 2 cas sur 1'000 coloscopies → En cas d'administration d'un sédatif, vous ne pourrez pas conduire de véhicule durant 12 à 24 heures (effets des sédatifs)

Quelle est votre préférence concernant le dépistage du cancer colorectal?

- A. Ne pas faire le test
- B. Plutôt colonoscopie
- C. Autant recherche de sang occulte que coloscopie
- D. Plutôt recherche de sang occulte dans les selles
- E. Autre méthode (sigmoïdoscopie, coloscopie virtuelle)
- F. Je ne sais pas

Variations per pays

A

Prescription dans les 6 derniers mois

Le diagnostic erronné silencieux

b
UNIVERSITÄT
BERN

Si opérer la fausse jambe est une erreur médicale, qu'en est-il d'opérer le.la fau.x.sse patient.e?

Jack Wennberg

Better a murder than a misdiagnosis.
House MD

"Nous avons passé une **quantité phénoménale de temps et d'énergie** au cours des dernières décennies à développer, discuter et débattre des **guidelines**. (...) Il semble que ce serait beaucoup plus productif de **consacrer cette énergie à l'éducation des personnes visées par les dépistages** sur ses avantages et inconvénients et de s'engager dans la voie de la prise de décision partagée." Stephanek, E. 2011

Edward Stefanek. Uninformed Compliance or Informed Choice? A Needed Shift in Our Approach to Cancer Screening. *J Natl Cancer Inst.* Nov 21 2011.

Diagnostic des préférences

- Préférence d'issue clinique (outcome)
- Préférence de traitement
- Préférence de santé en général

Mulley AG, Trimble C, Elwyn G; The Kings Found 2012

Présentation en fréquence naturelles

En absence de
dépistage, environs
2 personnes sur 100
décéderont de cancer
du colon avant 80 ans
en Suisse.

En présence d'un
dépistage, environs
1 personnes sur 100
décédera de cancer du
colon avant 80 ans en
Suisse.

2 options offertes:

Recherche de sang occulte dans les selles

Chaque 2 ans

ou

Coloscopie de dépistage

Chaque 10 ans

Comment réaliser le test?	<ul style="list-style-type: none"> → Prélèvement au domicile d'une quantité minimale de selles à l'aide d'un dispositif spécialement fourni → Envoi postal et analyse du prélèvement dans un laboratoire spécialisé 	<ul style="list-style-type: none"> → «Préparation au domicile»: régime alimentaire durant 48 heures et absorption d'une solution spéciale pour «nettoyer» son intestin la veille → Réalisation dans le cabinet d'un gastroentérologue ou en clinique/hôpital <ul style="list-style-type: none"> ▶ → Vous recevrez généralement un sédatif pour permettre un léger endormissement ▶ → L'examen dure habituellement 30-45 minutes, parfois davantage s'il faut enlever des polypes
Obtention des résultats	→ Retour des résultats par courrier à votre domicile et vers votre médecin	→ Résultat oral de votre examen le jour même, compte rendu définitif par courrier à votre domicile et vers votre médecin
Remboursement du test	→ Remboursement entre 50 et 69 ans par l'assurance de base avec exemption de franchise (coût résiduel par test: 4.60 CHF)	→ Remboursement entre 50 et 69 ans par l'assurance de base avec exemption de franchise (coût résiduel par test: entre 80 et 160 CHF)
Rythme de réalisation	→ Tous les deux ans	→ Tous les dix ans
Quels sont les avantages?	<ul style="list-style-type: none"> → Pas de préparation nécessaire → Facile à réaliser 	<ul style="list-style-type: none"> → Meilleur test pour détecter les polypes avant qu'ils n'évoluent en cancer → Les polypes sont directement enlevés pendant l'examen
Fiabilité pour détecter le cancer du colon	→ Bonne si réalisation régulière, tous les 2 ans	→ Excellente, si la «préparation au domicile» est correctement réalisée
Quels sont les inconvénients?	<ul style="list-style-type: none"> → Risque de résultat « faux négatif»: polypes et cancers ne saignent pas toujours. Il faut donc répéter le test tous les deux ans au minimum → Risque de résultat « faux positif»: un saignement digestif peut s'observer sans présence de polype ou cancer → En cas de test positif, il faudra réaliser systématiquement une coloscopie 	<ul style="list-style-type: none"> → Risque très faible de complication sévère (perforation de l'intestin ou saignement important): environ 2 cas sur 1'000 coloscopies → En cas d'administration d'un sédatif, vous ne pourrez pas conduire de véhicule durant 12 à 24 heures (effets des sédatifs)

Programme vaudois de dépistage du cancer du colon

Dépistage du cancer
du colon:

dès 50 ans
**J'en parle à
mon médecin**

Dépistage du cancer du colon
Canton de Vaud

Processus

- Coordination et intégration perspective des épidémiologues, spécialistes, médecin praticien, santé publique, payeurs, représentants patient-e-s
- Processus itératif
- Liste de 10 items pour aides décisionnelles
- Critères IPDAS pour évaluer contenu
- Critères du Clear Communication Index
- Test avec communauté cible:
 - 2 groupes de population migrante
- Processus continu d'amélioration avec Groupe Participatif d'Usagers-citoyens (GPUC)

Processus continu d'amélioration avec Groupe Participatif d'Usagers-Citoyens (GPUC)

Impact des aides décisionnelles u^b

Revue Cochrane de 115 RCTs

- Bénéfice
 - Améliore connaissances patient-e-s (*preuve qualité élevée*)
 - Participant-e-s et leurs clinicien-ne-s plus susceptibles de parler de la décision lorsqu'ils utilisaient un outil d'aide à la décision (*preuve qualité élevée*)
 - Attentes plus précises quant aux avantages et aux inconvénients des options (*preuves de qualité modérée*)
 - Participation davantage à la prise de décision (*preuves de qualité modérée*)
 - Les personnes qui utilisent les outils d'aide à la décision pourraient réussir à réaliser des décisions qui sont cohérentes avec leurs valeurs (*faible niveau de preuve*)
- Impact variable sur les décision:
 - Diminue pourcentage de chirurgie invasive
 - Diminue dépistage par PSA
- Pas d'impact significatif sur:
 - Satisfaction
 - Anxiété
 - Santé en général

Matériel distribué aux médecins de famille

Programme vaudois de dépistage du cancer du colon

Dépistage du cancer du colon:

dès 50 ans
J'en parle à mon médecin

Programme vaudois de dépistage du cancer du colon: de 50 à 69 ans

Faire un dépistage?

En absence de dépistage, 2 personnes sur 100 décéderont de cancer du colon avant 80 ans en Suisse.

En présence d'un dépistage, environ 1 personne sur 100 décèdera de cancer du colon avant 80 ans en Suisse.

	Chaque 2 ans	Chaque 10 ans
Comment réaliser le test?	<ul style="list-style-type: none"> Traitement du dossier -> envoi de la boîte à l'adresse indiquée Envoyez la boîte à l'adresse indiquée dans un laboratoire spécialisé 	<ul style="list-style-type: none"> Préparation du dossier -> envoi de la boîte à l'adresse indiquée Préparation d'une solution spéciale pour « nettoyer » son intestin la veille Préparation dans le cabinet d'un gastroentérologue ou un chirurgien hospitalier Il faut recevoir personnellement un matériel pour permettre un léger endossement Il faut recevoir dans le laboratoire 30-45 minutes, parties dévissées et il faut observer ses symptômes
Observation des résultats	Reçoit des résultats par courrier à votre domicile et en votre résidence	Réception oral de votre examen le jour même, compte rendu détaillé par courrier à votre domicile et en votre résidence
Remboursement du test	Remboursement entre 50 et 69 ans par l'assurance de base avec participation de 10% (partout, 4.00 CHF) à votre charge	Remboursement entre 50 et 69 ans par l'assurance de base avec participation de 10% (partout, 4.00 CHF) à votre charge
Rythme de réalisation	Tous les deux ans	Tous les dix ans
Quels sont les avantages?	<ul style="list-style-type: none"> Pas de préparation nécessaire Facile à réaliser 	<ul style="list-style-type: none"> Méthode test pour détecter les polypes avant qu'ils n'évoluent en cancer Les polypes sont directement envoyés pendant l'examen
Avantage pour détecter le cancer du colon	Bonne réalisation régulière, tous les 2 ans	Excellente, si la préparation au domicile est correctement réalisée
Quels sont les inconvénients?	<ul style="list-style-type: none"> Risque de résultat « faux positif » (examen et examen ne s'ajoutent pas toujours, il faut donc répéter le test tous les deux ans au minimum) Risque de résultat « faux positif » - un dépistage positif peut entraîner sans nécessité de réaliser un cancer En cas de test positif, il faudra réaliser systématiquement une coloscopie 	<ul style="list-style-type: none"> Le test nécessite la consultation d'un spécialiste (gastroentérologue ou chirurgien) pour la préparation (jeûne et lavement) et pour l'analyse (envoi par courrier) En cas d'administration d'un médicament, vous ne pouvez pas conduire de véhicule avant 12 à 24 heures (selon des médicaments)

Fiche d'information et d'aide à la décision pour le Programme vaudois de dépistage du cancer du colon

UNIVERSITÄT
LAUSANNE

Document est destiné aux médecins et résumant les données clés dans le cadre d'une **décision partagée** avec leur patient-e

- Quelle est la fréquence du cancer colorectal (CCR) dans le canton de Vaud ?**
- Environ 5% des hommes et 3% des femmes reçoivent un diagnostic de CCR avant 80 ans.¹
 - Environ 2% des hommes et 1% des femmes en meurent avant 80 ans.
- Quel pourcentage de la population vaudoise est à jour avec le dépistage et quel son bénéfice?**
- 14% de la population vaudoise de 50 à 69 ans se fait à jour avec le dépistage pour le CCR soit par recherche de sang occulte dans les selles (FOBT) ou par endoscopie (coloscopie et sigmoïdoscopie).¹
 - On estime que la pratique régulière d'un dépistage permet une réduction absolue de la mortalité par cancer colorectal de 1% avant l'âge de 80 ans (de 2/100 à 1/100).
- Quelle personne est ELIGIBLE pour le programme de dépistage ?**
- Le dépistage est destiné à la population sans facteurs de risque de 50 à 69 ans.²
- Quelle personne est EXCLUE du programme de dépistage (temporaire ou définitive, selon contexte) ?**
- Pour les populations à risque élevé ou très élevé, la coloscopie d'emblée est recommandée. L'âge de début du dépistage ainsi que la fréquence dépend de la maladie sous-jacente (à discuter avec le gastroentérologue).
 - Risque élevé de CRC:
 - Antécédents personnels: CCR ou polype (>1 cm, adénome villeux ou tubuleux-villeux, dysplasie haut degré)
 - Antécédents familiaux (parenté de 1er degré): CCR ou polype < 60 ans
 - Colite ulcéreuse ou maladie de Crohn après 8-10 ans (pancolite) ou 15-20 ans si colite gauche
 - Autres: irradiation abdominale dans l'enfance (>30Gy), Acromégalie
 - Risque très élevé de CRC: Polyposse Adénomateuse Familiale (PAF), Syndrome de Lynch (HNPCC), autre.
- Maladie intercurrentielle grave**
- Symptômes digestifs récents ou rectorragie macroscopique -> coloscopie diagnostique nécessaire

Cette notice explique comment utiliser le test. Lisez la notice soigneusement!

Etape 2 pour votre dépistage:

Prescription dans les 6 derniers mois et intention de prescrire pour les 6 mois à venir

Intégrer aides à la décision en consultation?

Intégrer aides à la décision en consultation?

u^b

b
UNIVERSITÄT
BERN

Institutions
académiques

Industrie
pharmaceutique
Laboratoires

Professionel-le-s de santé:
- Spécialistes
- Pharmacien-ne-s
- Hôpitaux

Aides à la
décision

Consultation

Décisions
politiques

ONGs:
-Ligue contre Cancer
-SwissCancerScreening

Assurances-
maladies

Famille
Amis

Environnement

Street-level bureaucracy

- The closer one is to the source of the problem, the greater one's ability to influence it
- Discretion
- Autonomy

CBPR Conceptual Model: 2013

Adapted from: Wallerstein, Oetzel, Duran, Tafoya, Belone, Rae, "What Predicts Outcomes in CBPR," in *CBPR for Health From Process to Outcomes*, Minkler & Wallerstein (eds). San Francisco, Jossey-Bass, 2008); and Wallerstein & Duran, CBPR contributions to intervention research: The intersection of science and practice to improve health equity, *Am. J. Public Health*; S1, 2010: 100, S40-S46.

Conclusions

Défis

- Variations dans les soins
- Nécessité d'intégrer les préférences des patient-e-s

Développements

- Aides à la décision en complément aux guidelines
- Développements d'aides à la décision
 - Interprofessionnalité, interdisciplinarité
 - Indépendance économique des développeu-se-r-s
 - Implication public cible dans le développement
 - «EBRC» – Evidence-based risk communication
- Formation des professionnel-le-s de santé
 - Approches participatives basées dans la communauté